



FICHA TÉCNICA MIYAMINO POWER

FABRICANTE

MIYAMONTE MEX, S.P.R. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

AGROTRADE MEXICO S DE RL DE CV

La Providencia 285, Col. Real de Peña.

C.P. 25256

INFORMACIÓN GENERAL

- Bioestimulante foliar orgánico

MODO DE ACCIÓN

MIYAMINO POWER producto hecho a base de aminoácidos, que estimula el desarrollo vegetativo, funciona como un inductor de tolerancia a diferentes estados de estrés provocados a la planta, aporta elementos nutritivos, estimula la actividad metabólica mejorando las condiciones de desarrollo de floración y uniformidad en la maduración y tamaño de los frutos

Propiedades fisicoquímicas	
Color	Café
Olor	Aminas
Solubilidad en agua	100 %
Apariencia	Líquida
Densidad	1.060 g/ml
Ph	5.5-6

RECOMENDACIONES DE USO

Forma de aplicación

MIYAMINO POWER es un producto que se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo por aspersión foliar, diluido en la cantidad de agua requerida para cubrir una hectárea y lograr un buen cubrimiento de todos los órganos aéreos de la planta

Aplicar en estados de estrés hídrico, por aplicación de herbicidas, fungicidas e insecticidas y cuando se detecten problemas de clorosis ya que **MIYAMINO POWER** contiene nitrógeno que ayuda a que se recupere la planta y pueda producir estructuras firmes



DOSIS

Cultivos	Dosis l/ha	Aplicación
Solanáceas: chile, pimiento, papa, tomate, berenjena	2 a 3 l /ha	Fertirriego: realizar la primera aplicación a los 8 días después de la emergencia o trasplante, el resto repetirlas cada 8 días durante el ciclo.
Cucurbitáceas: melón, sandía, calabacita.	2 a 3 l /ha	Aplicación foliar: realizar una aplicación foliar a los 15 días después de la emergencia o trasplante. Realizar 3 aplicaciones durante la floración y/o amarre de fruto, y dos aplicaciones a principios de la maduración. Las aplicaciones deberán realizarse cada 15 días.
Frutales: manzana, pera, durazno, aguacate, mango, cítricos, guayaba, nogal.	4 a 8 l /ha	Fertirriego: realizar la primera aplicación a los 8 días después de la emergencia o trasplante, el resto repetirlas cada 8 días durante el ciclo.
Frutillas: zarzamora, frambuesa, fresa y arándano	2 a 5 l /ha	Aplicación foliar: realizar una aplicación foliar a los 15 días después de la emergencia o trasplante. Realizar 3 aplicaciones durante la floración y/o amarre de fruto, y dos aplicaciones a principios de la maduración. Las aplicaciones deberán realizarse cada 15 días.

MODO DE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Ponga la tercera parte de agua en el tanque de preparación, si va a usar otros agroquímicos agréguelos en este momento complete el tanque con el volumen de agua necesario, adicione MIYAMINO POWER y agite adecuadamente hasta que quede bien mezclado

PRECAUCIONES Y MANEJO ADECUADO

El manejo de este producto no representa ningún riesgo para la salud, sin embargo se recomienda utilizar ropa y equipo de protección adecuado: overol de mangas largas, mascarillas, guantes, gafas y botas. No comer, beber o fumar durante el uso y manejo del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

Guarde el producto en su envase original, debidamente etiquetado y cerrado fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar en casa habitación

Manténgase en un lugar fresco, seco y ventilado

COMPATIBILIDAD

MIYAMINO POWER es compatible con los fertilizantes foliares comúnmente usados, si se desconoce la compatibilidad con otros productos, deberá realizarse una prueba previa

FITOTOXICIDAD

MIYAMINO POWER No es tóxico, ni fitotóxico para los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas

PRESENTACIÓN

MIYAMINO POWER Disponible en bote de 1 litro, 5 litros, y 20 litros



INFORMACION DE GARANTÍA

MIYAMINO POWER

Propiedades químicas	
Zinc	1.23
Fierro	4.70
Potasio disponible	1.70
Fosforo disponible	5.00
Aminoácidos totales	1.072
Nitrógeno total	0.659
Base orgánico de ácidos fúlvicos	9.987
Acondicionadores y diluyentes naturales	88.339
Total	100

CORROSIVIDAD DEL PRODUCTO

El producto es corrosivo	
El producto no es corrosivo	X